



Mae Brechu yn achub bywydau
Vaccination saves lives



Respiratory syncytial virus (RSV) vaccination for older adults

This leaflet explains the RSV vaccination programme for adults who are:

- **aged 75 years or older, or**
- **living in a care home for older adults**

Mae'r wybodaeth hon ar gael yn Gymraeg.
This information is available in Welsh.

You can get information about vaccinations in other formats. This includes British Sign Language (BSL), Easy Read, large print and audio. Visit: phw.nhs.wales/vaccines/accessible-information



Scan me for more
information
on RSV

IMM226



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Key facts

Respiratory syncytial virus (RSV) is a common cause of respiratory tract infections. For most adults and children, RSV causes a mild illness, such as a cough or cold, and usually gets better on its own.

In a small number of older adults, particularly those with heart or lung disease or a weakened immune system, RSV infection can lead to serious health problems such as pneumonia (infection of the lungs) or even death.

Most RSV infections occur in autumn and winter, but you can have the RSV vaccine at any time of the year.

RSV infection is more common in children, but is most serious for small babies and older adults.

The RSV vaccine is safe. It meets all safety standards. Once a vaccine is in use, its safety continues to be monitored.

**Act now to protect yourself
from RSV**

You can help protect yourself against serious illness from RSV by having the RSV vaccination when it is offered to you.



How is RSV spread?

RSV spreads when someone with the virus coughs or sneezes. You can also catch RSV by touching surfaces or objects that have the virus on them. Most people have had RSV as a child, but a past infection may not prevent you from getting RSV again.

What are the symptoms of RSV?

RSV infection causes symptoms similar to a cold. These include:

- a cough
- a runny or blocked nose
- sneezing, and
- tiredness.

In some cases, RSV can cause wheezing, shortness of breath or a fever, and may lead to pneumonia.

Why is the RSV vaccine part of the routine UK immunisation schedule?

Before the RSV vaccine programme started, RSV was thought to cause around 400 to 600 deaths each year in Wales in people aged 75 or over. In September 2023, vaccine experts gave their advice on RSV vaccination. They said there should be an RSV vaccination programme to help protect older adults.

There is also an RSV vaccination programme for pregnant women to help protect babies against serious illness from RSV.

Can I still get RSV even if I have had the vaccine?

Vaccination is one of the best ways to prevent severe illness from RSV. No vaccine is 100% effective, so it is still important to know the signs and symptoms of RSV, even if you are vaccinated.

How do I protect myself?

You can get the vaccine to help protect against RSV.

You can also protect yourself and others by:

- covering your mouth and nose when coughing or sneezing
- throwing tissues in the bin as soon as possible
- regularly washing your hands with soap and warm water, and
- keeping your environment (for example, hard surfaces) clean.



Who will be offered the RSV vaccine?

You will be offered the RSV vaccine if:

- you are aged 75 or over, or
- you live in a care home for older adults (whatever your age)

If you are 74 and do not live in a care home, you will be offered the vaccine from your 75th birthday.

How will I get my vaccination?

The NHS will let you know when and where to get the vaccine. If you think you might have missed the invitation, speak to your GP surgery.

It is an injection given in the upper arm.

Do I need to have the vaccine every year?

No. Vaccine trials show the vaccine gives good protection for at least two years and is likely to last longer.

Is there anyone who should not have the RSV vaccine?

There are very few people who cannot have the RSV vaccine. The vaccine should not be given to anyone who has had a serious (life-threatening) reaction to:

- a previous dose of the vaccine, or
- any ingredient in the vaccine.

Make sure you tell the person giving you the vaccine if you have had a serious allergic reaction to the vaccine or its ingredients in the past.

Is the RSV vaccine safe?

Yes, the RSV vaccine is safe. It meets all safety standards. Once a vaccine is in use, its safety continues to be monitored.



Are there any side effects from the vaccine?

Like all medicines, vaccines can cause side effects, but not everyone gets them. Most side effects are mild and may last a day or two.

For older adults, the most common side effects include:

- pain, swelling and redness in the arm where the injection was given
- headache
- tiredness
- muscle or joint pain.

Rare or very rare side effects from the vaccine include:

- Guillain-Barré syndrome (GBS), a nerve condition that can cause muscle weakness, and
- allergic reactions, such as swelling of the face, lips, tongue or throat, hives (a raised, itchy rash), difficulty swallowing and feeling dizzy.

GBS is a rare but serious condition. There are thought to be around 10 to 25 cases of GBS for every million doses of the vaccine given to older people. GBS can also happen after some common infections. This includes flu, tummy bugs, and in rare cases after other vaccines.

If you notice tingling, numbness, weakness, sharp pain or pins and needles in your hands, feet, arms or legs after the vaccine, get medical attention straight away. Ask for an urgent GP appointment or get help from NHS 111 Wales.

Rarely, people can have a severe reaction soon after the vaccination, which causes breathing difficulties and may cause them to collapse. This is called an anaphylactic reaction, and it can also happen with other medicines and food. These reactions are extremely rare, affecting less than one in a million people. Staff who give vaccinations are trained to manage these reactions.

People who have an anaphylactic reaction can be successfully treated and usually recover within a few hours.

Serious side effects are rare. Overall, the vaccine is safer than the risk of serious illness from RSV infection.

See the back page of this leaflet for further details on:

- the vaccine, including all possible side effects, and
- reporting suspected side effects through the Yellow Card scheme.

If you have any questions about side effects, you can ask the person giving you the vaccine.

If the side effects last for more than a few days, you should talk to your healthcare professional or contact NHS 111 Wales by calling **111**.



Can the RSV vaccine be given at the same time as other vaccines?

The RSV vaccine can be given at the same time as most other vaccines. The person giving you your vaccine will let you know which vaccines can be given together.

If I am unwell, should I have the vaccine?

A cold or other minor illness is not a reason to delay your vaccine.

If you are unwell, it is better to wait until you have recovered to have the vaccine, but you should try to have it as soon as possible. If you cannot attend your vaccination appointment, please cancel and rearrange the appointment. If in doubt, discuss this with the person giving you your vaccination.

Did you know?

These other routine vaccines are available for older adults.

- Influenza (flu)
- Pneumococcal
- Shingles

For more information, visit phw.nhs.wales/vaccines

To help stop viruses spreading, remember to:



Catch it

Use a tissue when you sneeze or cough.



Bin it

Put the tissue in the bin as soon as possible.



Kill it

Wash your hands or use hand sanitiser.

The information in this leaflet is correct at the time of publication. For the most up-to-date information, please visit phw.nhs.wales/vaccines

Further information

If you have any questions or want more information, you can go to 111.wales.nhs.uk (external site), talk to your doctor or nurse, or contact NHS 111 Wales by calling **111**.

You can find out more information on vaccines offered in Wales at phw.nhs.wales/vaccines

To find out more about the vaccine, including its contents and possible side effects, go to medicines.org.uk/emc (external site). You will need to enter the name of the vaccine in the search box. You can also see the patient leaflet online.

You can find the name of the vaccine at phw.nhs.wales/RSV-older-adults

You should report suspected side effects online at www.mhra.gov.uk/yellowcard (external site), by downloading the Yellow Card app, or by calling **0800 731 6789** (Monday to Friday, 9am to 5pm)

To find out how the NHS uses your information, go to 111.wales.nhs.uk/AboutUs/Yourinformation (external site)



Scan me to go to
the Public Health
Wales website

Version 3 | March 2026

Public Health Wales is the national public health agency in Wales. We work to protect and improve health and well-being and reduce health inequalities for the people of Wales.

© Public Health Wales NHS Trust

(with acknowledgment to UK Health Security Agency)

ISBN 978-1-83766-820-5

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch fynd i 111.wales.nhs.uk (safle allanol), siarad â'ch meddyg neu nysr, neu gysylltu â GIG 111 Cymru drwy ffonio **111**.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o ic.gig.cymru/brechlynnau

I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn,

ei gynnwys a'i sgil-ffeithiau posibl, ewch i

medicines.org.uk/emc (safle allanol, Saesneg yn unig). Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y dalen i

glefion ar-lein.

Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn

ic.gig.cymru/RSV-oeolion-hyn

Dylech roi gwybod am sgil-ffeithiau a amheuir

ar-lein yn www.mhra.gov.uk/yellowcard (safle

allanol, Saesneg yn unig), drwy lawrlwytho ap y

Cerdyn Melyn, neu drwy ffonio **0800 731 6789**

(Dydd Lun i Ddydd Gwener, 9yb i 5yh).

I gael gwybod sut mae'r GIG yn defnyddio'ch

gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/

amdanomni/eichgwybodaeth (safle allanol).

Sganiwch fi i fynd
i wefan lechyd
Cyhoeddus Cymru



Fersiwn 3 | Mawrth 2026

lechyd Cyhoeddus Cymru yw asiantaeth lechyd y cyhoedd cenedlaethol

Cymru. Rydym yn gweithio i amddiffyn a gwella lechyd a llesiant a lleihau

anghydraddoldebau lechyd ar gyfer pobl Cymru.

@ Ymddiriedolaeth y GIG lechyd Cyhoeddus Cymru

(gyda chydunbuddiaeth i Asiantaeth Diogelwch lechyd y DU)

ISBN 978-1-83766-820-5

Er mwyn helpu i atal feirysau rhag lledaenu, cofiwch:

Ei ddal
Defnyddiwch hances bapur pan fyddwch chi'n tisian neu'n peswch.



Ei datlu
Rhoch yr hances bapur yn y bin cyn gynted â phosibl.



Ei ddifa
Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo.



Mae'r wybodaeth yn y datlen hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i icc.gig.cymru/brechlynnau

Oeddech chi'n gwybod?

Mae'r brechlynnau arferol canlynol ar gael i oedolion hŷn:

• Y ffliw

• Niwmococoi

• Yr Eryr

Am fwy o wybodaeth, ewch i icc.gig.cymru/brechlynnau

Os ydych chi'n sâl, mae'n well aros nes eich bod wedi gwella cyn cael y brechlyn, ond dylech chi geisio ei gael cyn gynted â phosibl. Os na allwch ddod i'ch apwyntiad brechu, canslwrch ac aildrefnwch yr apwyntiad. Nid yw annwyd neu fân salwch arall yn rheswm dros ohirio eich brechlyn. Os oes gennyfch amheuan, trafodwch hyn gyda'r unigolyn sy'n rhoi eich brechiad i chi.

Nid yw annwyd neu fân salwch arall yn rheswm dros ohirio eich brechlyn.

Os ydwi'n sâl, a ddylwn i gael y brechlyn?

Gellir rhoi'r brechlyn RSV ar yr un pryd â'r rhan fwyaf o frechlynnau eraill. Bydd yr unigolyn sy'n rhoi eich brechlyn i chi yn rhoi gwybod i chi pa frechlynnau y gellir eu rhoi gyda'i gilydd.

A ellir rhoi'r brechlyn RSV ar yr un pryd â brechlynnau eraill?



111.

Os yw'r sgil-ffeithiau'n para am fwy nag ychydig ddyddiau, dylech siarad â'ch gweithiwr gofal iechyd profesiynol neu gysylltu â GIG 111 Cymru drwy ffonio

Os bydd genny'ch gwestiynau am sgil-ffeithiau, gallwch ofyn i'r unigolyn a fydd yn rhoi'r brechlyn i chi.

Cerdyn Melyn.

- adrodd am sgil-ffeithiau a amheuir trwy gynllun y
- y brechlyn, yn cynnwys yr holl sgil-ffeithiau posibl, ac

fanylion am:

Gweler tudalen gefn y daflen hon i gael rhagor o

o ganlyniad i haint RSV.

Mae sgil-ffeithiau difrifol yn brin. Yn gyffredinol, mae'r brechlyn yn fwy diogel na'r risg o salwch difrifol

ychydig oriau.

Gall pobl sy'n cael adwath anaffylactig gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer maent yn gwella o fewn

hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn.

milw'n o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi'u yn hynod o brin, ac yn effeithio ar lai nag un mewn meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn adwath anaffylactig. Gall ddigwydd hefyd gyda anadlu a gall beri iddynt lewgu. Gelwir hyn yn

ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau

Yn anaml, gall pobl gael adwath difrifol yn fuan

A oes unrhyw sgil-effeithiau yn gysylltiedig â'r brechlyn?

Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynnau achosi sgil-effeithiau, ond ni fydd pawb yn eu profi. Mae'r rhan fwyaf o'r sgil-effeithiau yn ysgafn a byddant fel arfer yn gwella ar ôl diwrnod neu ddau.

I oedolion hŷn, y sgil-effeithiau mwyaf cyffredin yw:

- poen, chwyddo a chochni yn y traich lle rhoddwyd y pigiad.
- cur pen
- blinder
- poenau yn y cyhyrau neu'r cymalau

Mae sgil-effeithiau prin neu brin iawn o'r brechlyn yn cynnwys:

- Syndrom Guillain-Barre (GBS), cyflwr nerfol sy'n gallu achosi gwendid yn y cyhyrau, ac
- adweithiau alergaidd, megis chwydd yn y wneb, y gwefusau, y tafod neu'r gwddf, llosg danadl (brech chwyddedig, sy'n cosi), anhawster llyncu, a theimlo'n benysgafn.

Mae Syndrom Guillain-Barre (GBS) yn gyflwr prin ond difrifol. Y gred yw bod tua 10 i 25 achos o Syndrom Guillain-Barre (GBS) am bob miliwn dos sy'n cael ei roi i bobl hŷn. Gall GBS ddigwydd ar ôl rhai heintiau cyffredin hefyd. Mae hyn yn cynnwys ffliw, anhwylder ar y stumog, ac yn anaml ar ôl brechlynnau eraill.

Ewch i gael cyngor meddygol ar unwaith os byddwch chi'n sylwi ar gosi, diffyg teimlad, gwendid, poen minog neu binnau bach yn eich dwylo, eich traed, eich breichiau neu goesau ar ôl cael y brechlyn. Gofynnwch am apwyntiad brys gyda meddyg teulu neu ceisiwch gymorth gan GIG 111 Cymru.



Mae Brechu yn Achub Bywyddau

A oes angen i mi gael y brechlyn bob blwyddyn?

Na. Mae trelalon o'r brechlyn wedi dangos bod y brechlyn yn rhoi amddiffyniad da am o leiaf dwy flynedd a'i fod yn debygol o barh'n hirach.

A oes unrhyw un na ddylai gael y brechlyn RSV?

Ychydig iawn o bobl sydd ddim yn gallu cael y brechlyn RSV. Ni ddylech gael y brechlyn os ydych wedi cael adwaith difrifol (sy'n peryglu bywyd) i'r canlynol:

- dos blaenorol o'r brechlyn, neu
- gynhwysyn yn y brechlyn.

Siaradwch â'r sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi os ydych wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol.

A yw'r brechlyn RSV yn ddiogel?

Ydy, mae'r brechlyn RSV yn ddiogel. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Unwaith y bydd brechlyn yn cael ei ddefnyddio, mae ei ddiogelwch yn parhau i gael ei fonitro.

Bydd y GIG yn rhoi gwybod i chi pryd a ble i gael y brechlyn. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi methu'r gwahoddiad, siaradwch â'ch practis meddyg teulu.

Maer brechlyn yn cael ei roi trwy chwistrelliad yn rhan uchaf y traich.

Sut byddaf yn cael fy mrechiad?

- Os ydych chi'n 74 mlwydd oed ac nad ydych chi'n byw mewn cartref gofal, cewch gynnig y brechlyn ar ôl chi gael eich pen-blwydd yn 75 mlwydd oed.
- os ydych chi'n byw mewn cartref gofal i oedlon hyn (beth bynnag fo'ch oedran)
 - ydych chi'n 75 mlwydd oed neu hyn, neu

Cewch gynnig y brechlyn RSV os:

Pwy fydd yn cael cynnig y brechlyn RSV?



- gorchuddio'ch ceg a'ch trwyn wrth beswch neu disian
 - taffu hancesi papur yn y bin cyn gynted â phosibl
 - golchi'ch dwylon rheolaidd â sebon a dŵr cynnes, a
 - chadw eich amgylchedd (er enghraifft, arwynebau caled) yn lân.
- Gallwch hefyd amddiffyn eich hun ac eraill trwy wneud y canlynol:

Gallwch gael y brechlyn i helpu i amddiffyn rhag RSV.

Sut ydwi'n amddiffyn fy hun?

Brechu yw un o'r ffyrdd gorau o atal salwch difrifol oherwydd RSV. Nid oes unrhyw frechlyn 100% yn effeithiol, felly mae'n dal yn bwysig gwybod arwyddion a symptomau RSV, hyd yn oed os ydych chi wedi cael eich brechu.

A allaf gael RSV os wyt wedi cael y brechlyn?

Mae rhaglen frechu RSV hefyd ar gael i fenywod beichiog er mwyn helpu i amddiffyn babanod rhag salwch difrifol o ganlyniad i RSV.

Cyn i'r rhaglen brechu rhag RSV ddechrau, y gred yw bod RSV yn achosi tua 400 i 600 o farwolaethau bob blwyddyn yng Nghymru mewn pobl 75 mlwydd oed neu hŷn. Ym mis Medi 2023, rhoddodd arbenigwyr brechlyn eu cynngor ar frechu RSV. Dywedon nhw y dylai fod rhaglen frechu RSV i helpu i amddiffyn oedolion hŷn.

Pam mae'r brechlyn RSV yn rhan o amserlen imiwneiddio arterol y DU?



Sut mae RSV yn cael ei Iedaenu?

Mae RSV yn lledaenu pan fydd rhywun sydd â'r feirws yn pesychu neu'n tisian. Gallwch hefyd ddal RSV trwy gyffwrdd ag arwynebau neu wrthrychau sydd â'r feirws arnynt. Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi cael RSV pan oeddent yn blentyn, ond etfallai na fydd haint yn y gorffennol yn eich atal rhag cael RSV eto.

Beth yw symptomau RSV?

Mae haint RSV yn achosi symptomau tebyg i annwyd. Mae'r rhain yn cynnwys:

- peswch
- trwyn yn rhedeg neu wedi blocio
- tisian, a
- blinder.

Mewn rhai achosion, gall RSV achosi gwichian, diffyg anadl neu dwymyn, a gall arwain at niwmonia.

Ffeithiau allweddol

Mae feirws syncytiol anadlol (RSV) yn achos cyffredin o heintiau'r llwybr anadlol. I'r rhan fwyaf o oedolion a phlant, mae RSV yn achosi salwch ysgafn, fel peswch neu annwyd, ac fel arfer mae'n gwella ar ei ben ei hun.

Mewn nifer fach o oedolion hyn, yn enwedig y rhai â chlefyd y galon neu'r ysgyfaint neu system imiwnedd wan, gall haint RSV arwain at broblemau iechyd difrifol fel niwmonia (haint yr ysgyfaint) neu hyd yn oed farwolaeth.

Mae'r rhan fwyaf o heintiau RSV yn digwydd yn yr hydref a'r gaeaf.

Mae haint RSV yn fwy cyffredin mewn plant ond mae'n fwyaf difrifol i fabanod bach ac oedolion hyn.

Mae'r brechlyn RSV yn ddiogel. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Unwaith y bydd brechlyn yn cael ei ddefnyddio, mae ei ddiogelwch yn parhau i gael ei fonitro.

**Gweithredwch nawr!
amddiffyn eich hun rhag RSV**

Gallwch helpu i amddiffyn eich hun rhag salwch difrifol o RSV drwy gael y brechiad RSV pan gaiff ei gynig i chi.



Mae Brechu yn achub bywydau
Vaccination saves lives



Brechïad feirws (RSV) ar gyfer oedolion hŷn

Mae'r datlen hon yn esbonio'r rhaglen
frechu RSV ar gyfer oedolion sydd:

- yn 75 mlwydd oed neu hŷn, neu
- sy'n byw mewn cartref gofal i
oedolion hŷn

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am
frechu mewn fformatau eraill. Mae hyn yn
cynnwys iaith Arwyddion Frydain (BSL),
Hawdd ei Ddeall, print bras a sain. Ewch i:
icc.gig.cymru/brechlynnau/adnoddau-hygrch

GIG
CYMRU
NHS
WALES
Iechyd Cyhoeddus
Public Health
Wales
Cymru



IMM226

Sganiai fi am ragor
o wybodaeth ar
RSV

